

Penser Biosécurité!

à la porte de la ferme ✓✓✓



Stop

Réduisez au minimum l'entrée de véhicules, de fournitures et d'équipements dans votre ferme et limitez l'accès des véhicules à votre troupeau.



Limiter

Limiter l'entrée au personnel essentiel, connecter les personnes et les véhicules.



Désinfecter

Désinfecter les véhicules et les équipements.



Désinfecter

Tout le personnel doit utiliser un pédiluve à l'entrée.



Minimiser

Réduisez au minimum les visites dans d'autres fermes avicoles. Si vous visitez d'autres fermes/granges, prenez une douche avant d'entrer sur le site.



Changement

Les éleveurs de volaille et les visiteurs doivent se changer en bottes et combinaisons jetables et propres à l'entrée du site.



Laver

Lavez-vous les mains et utilisez un désinfectant pour les mains avant et après avoir manipulé les oiseaux.



Nettoyer

Nettoyez tout aliment renversé et signalez toute eau stagnante au responsable de votre site.



Éviter

Évitez tout contact avec les oiseaux extérieurs.



Nuisibles

Maintenir et surveiller un programme de lutte contre les nuisibles, les rongeurs et les insectes sauvages.



Monitorer


Surveillez régulièrement la santé du troupeau et signalez immédiatement toute différence de comportement ou suspicion de maladie à votre responsable ou à votre vétérinaire.



Revoir

Lisez et révisez votre liste de contrôle de biosécurité pratique.

Penser **Biosécurité!** à la porte de la ferme




- Désinfecter les roues du véhicule



- Chaque véhicule et tout équipement doivent être enregistrés

- Tout le monde doit s'enregistrer à l'entrée



- Chaussures et vêtements dédiés à la ferme uniquement

Penser Biosécurité! au poulailler



Limiter

Limiter l'entrée au personnel essentiel.



Se changer

Les éleveurs de volailles et les visiteurs de chaque hangar/grange doivent se changer et porter des bottes et des combinaisons propres dédiées/jetables à leur entrée.



Désinfecter

Tout le personnel doit utiliser un pédiluve à l'entrée.



Laver

Lavez-vous les mains et utilisez un désinfectant pour les mains avant et après avoir manipulé les oiseaux.



Nettoyer

Nettoyez les aliments et l'eau renversés. Retirez immédiatement les oiseaux morts.



Prévenir

Empêcher l'accès aux oiseaux sauvages extérieurs.



Nuisibles

Maintenir et mettre en œuvre un programme de lutte antiparasitaire qui inclut les oiseaux sauvages, les rongeurs et les insectes.



Monitorer

Surveillez régulièrement la santé du troupeau et signalez immédiatement toute suspicion de maladie à votre responsable ou à votre vétérinaire.



Revoir

Lisez et révisez votre liste de contrôle de biosécurité pratique.

Point de contrôle de biosécurité à la ferme



**Nettoyer tous
les aliments
l'épardus**

Point de contrôle de biosécurité à la ferme



**Désinfection – Tout le
personnel doit utiliser
un pédiluve à l'entrée**

Point de contrôle de biosécurité à la ferme




Station d'appât pour rongeurs

Penser **Biosécurité!** au poulailler



■ **Tout le monde
doit s'enregistrer
à l'entrée**



■ **Pas d'accès sans
douche**



■ **Vêtements dédiés
au poulailler
uniquement**